

USO ORAL

USO VETERINÁRIO

# Alergocort®

Anti-inflamatório

## FÓRMULA:

Cada comprimido de 200mg contém:

Dexametasona ..... 0,5 mg  
Excipiente q.s.p. .... 200 mg

## INDICAÇÕES:

É recomendado para cães e gatos pela sua atividade anti-inflamatória, antirreumática e antialérgica, com baixo efeito sob o balanço hídrico e retenção de sódio. Suas principais indicações são em terapias de suporte nas dermatoses não específicas, como eczema de verão, de origem sistêmica, alérgicas e atópicas; nas condições inflamatórias de vários tipos, como nas artrites agudas e dores reumáticas; no tratamento das gonites e paresia posterior canina.

## MODO DE USAR:

Administrar por via oral, diretamente na boca do animal ou misturado ao alimento, segundo a posologia indicada.

## POSOLOGIA:

Em cães e gatos:

Dose mínima 0,025mg/Kg por dia.

Dose máxima 1,0mg/Kg por dia.

Administrar diariamente durante 7 dias por via oral com subsequente diminuição da dose diária, até atingir a dose de manutenção para posterior retirada da medicação. Em se tratando de terapia com glicocorticoide sistêmico, sua administração deve ser feita sob a orientação do Médico Veterinário, o qual deverá estabelecer a diminuição da dose e o espaçamento entre as administrações.

Posologia inicial diária recomendada:

Animais até 2,5Kg ..... ½ comprimido

Animais de 2,5 até 5Kg ..... 1 comprimido

Animais de 5 até 15 Kg ..... 2 comprimidos

Animais de 15 até 50Kg ..... 3 a 4 comprimidos

Acima de 50Kg ..... 3 a 4 comprimidos para cada 50Kg de peso

A dose diária pode ser dividida em 2 vezes e ser administrada a cada 12 horas.

A posologia adequada será determinada de acordo com o porte do animal e com a gravidade da afecção. Administrar por 7 dias consecutivos, caso não se obtenham sinais clínicos favoráveis o diagnóstico deve ser reavaliado. Ao final da terapia deve-se proceder uma diminuição gradativa da posologia, diminuindo a dose e aumentando o intervalo entre as administrações, até que uma dose de manutenção seja estabelecida pelo Médico Veterinário.

As possíveis alterações da posologia recomendada, devem ser determinadas pelo Médico Veterinário.

## EFEITOS COLATERAIS:

Embora raramente, podem ocorrer poliúria, polidipsia, hiperglicemia, glicosúria, letargia, fraqueza e alopecia.

Nos tratamentos prolongados o metabolismo de cálcio pode ser alterado. Esses sintomas podem significar a necessidade de reajuste na posologia.

## CONTRA-INDICAÇÕES:

O produto é contra-indicado em animais com insuficiência renal ou cardíaca grave, diabetes, osteoporose,

hipercorticalismo (Síndrome de Cushing), nefrite crônica e em fêmeas no último terço da prenhez.

## INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Fenitoína e fenobarbital podem aumentar o metabolismo de dexametasona e a quantidade de insulina necessária para animais diabéticos pode aumentar. O uso concomitante de dexametasona e ciclosporina aumenta os picos séricos de ambas as drogas. Estrogênios podem potencializar os efeitos da dexametasona.

## APRESENTAÇÃO:

Blistre contendo 10 ou 20 comprimidos de 200mg cada, acondicionado em cartucho, acompanhado de bula.

## VENDA SOB PRESCRIÇÃO E ADMINISTRAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Manter ao abrigo da luz solar, em local seco e fresco, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 8980 em 06/10/2004.

Responsável Técnico: Dr. Raul Eduardo Arias Palacios - CRMV-RJ nº 11.293.

Proprietário e Fabricante:



COVELI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.  
Rua Ari Barroso, 458/530 - Duque de Caxias - RJ  
CEP 25085-480  
CNPJ 33.927.419/0001-42  
Indústria Brasileira - Marca Registrada  
www.coveli.com.br



Tel.: (21) 3419-7329  
0800-7190000  
Caixa Postal: 37067  
CEP 22622-970 - RJ  
sac@coveli.com.br