

CARRAPATOX

CARRAPATICIDA E SARNICIDA

USO VETERINÁRIO
Pulverização e Banho



FÓRMULA

Cada 100mL contém:

Cipermetrina	10,0g
Veículo q.s.p.	100,0mL

INDICAÇÕES

Carrapaticida e sarnicida de uso externo para cães. Em instalações no combate a *Stomoxys calcitrans* e *Musca domestica*.

MODO DE USAR E POSOLOGIA

Cães - diluir 1mL de CARRAPATOX para 1 litro de água ou 20mL do produto para 20 litros de água e efetuar o banho ou pulverização.

Instalações:

Diluir 20mL de CARRAPATOX para 4 litros de água. Pulverizar estruturas como: pisos, paredes, teto e corredores. Utilizar 1 litro para cada 10 - 15m² de área, conforme tabela abaixo:

CARRAPATOX	QUANTIDADE DE ÁGUA	ÁREA EM m ²
20mL	4L	40/60
40mL	8L	80/120
60mL	12L	120/180

Nos casos de banho, pulverização nos animais ou nas instalações, se necessário, fazer reaplicações com intervalos de 20 dias.

PRECAUÇÕES

- Manter CARRAPATOX ao abrigo da luz.
- Não aplicar o produto em dias chuvosos ou de calor muito intenso.
- Evitar contato do produto com a pele e mucosas do corpo. Não pulverizar contra o vento.
- Não reaproveitar a embalagem vazia.
- Não misturar outros produtos ao CARRAPATOX.
- Produto tóxico para abelhas e peixes.
- Não lançar o produto em mananciais, rios e lagos.
- Não fumar nem ingerir alimentos durante a aplicação.
- Caso o produto atinja os olhos, lavá-los imediatamente com água corrente durante 10 minutos, no mínimo, e procurar atendimento médico.

- Utilizar luvas protetoras para utilização do produto.
- Não deixar que o animal se lamba, até que o pelo esteja seco.
- Deixar o animal secar a sombra, não utilizar calor.
- Em casos de sensibilidade, irritação ou desconforto, banhar o animal com água e sabão neutro para remoção do produto. Procurar um Médico Veterinário.

EM CASOS DE INTOXICAÇÃO ACIDENTAL EM HUMANOS

Em caso de ingestão acidental ou suspeita de intoxicação, procurar atendimento médico.

PARA O MÉDICO

Sintomatologia: salivação excessiva, respiração rápida e difícil com depressão.

Antídoto: não existe, deve-se fazer tratamento sintomático do colapso com anti-histamínico.

PARA O VETERINÁRIO

Utilizar terapêutica semelhante à descrita acima.

Categoria Toxicológica: II

Ação Tóxica: hipersensibilizante e irritante das mucosas.

Grupo químico: ester do Ácido Crisantêmico.

APRESENTAÇÕES

Frascos contendo 20mL e 100mL.

Conservar em local seco e fresco, entre 15 e 30°C, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Licenciado no Ministério da Agricultura
sob nº 4.824/94 em 02/09/1994.

Responsável técnico:

Dr. Naur Bellusci Filho - CRMV-SP nº 6516



INFLAMÁVEL

Venda sob prescrição
e orientação
do Médico Veterinário



Proprietário e Fabricante:

BIOFARM QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Av. João Batista Ferraz Sampaio, 710
14.876-150 - Jaboticabal - SP - Fone: 16 3209-3500
CNPJ: 00.256.591/0001-62
Insc. Est. 391.038.579.113



SAC - Serviço de Atendimento
ao Consumidor - 0800 702 3551
www.biofarm.com.br



BIOFARM

Tecnologia em veterinária



020244.200120.NV1