

# Flunixin\*

## Comprimidos 5 mg

**Anti-inflamatório,  
analgésico, antitérmico  
e antiendotóxico  
para cães.**

### Uso Veterinário

**Fórmula** - Cada comprimido contém:

Flunixinina Base .....5 mg\*

Excipiente, q.s.p. ....150 mg

\*Equivalentes a 8,3 mg de flunixinina meglumina.

### INDICAÇÕES:

**Flunixin\* Comprimidos 5 mg** é um anti-inflamatório não esteróide, não narcótico que apresenta potente ação analgésica, antitérmica e antiendotóxica.

É indicado para Cães em:

• **Reumatologia:** nas afecções agudas e crônicas do aparelho locomotor como: artrite não infecciosa, artrose, osteocondrite, tendinites e periartrites, miosites, displasia coxo-femural, entorses, degeneração cartilaginosa.

• **Oftalmologia:** conjuntivites alérgicas ou traumáticas, queratite, neovascularização da córnea, uveíte anterior isolada ou recidivante, coriorretinite e panoftalmia.

**Flunixin\* Comprimidos 5 mg** é muito eficaz no tratamento dos traumatismos do globo ocular e na preparação cirúrgica do olho.

• **Choque endotóxico e septicemias:**

**Flunixin\* Comprimidos 5 mg** combate os efeitos do choque endotóxico, principalmente na espécie canina, melhorando o débito cardíaco e a função respiratória, diminuindo a hemoconcentração e proporcionando a analgesia necessária.

• **Pneumologia:** **Flunixin\* Comprimidos 5 mg** combate a inflamação que é o elemento dominante da patogenia das broncopneumonias.

• **Pós-operatório:** **Flunixin\* Comprimidos 5 mg** não atrasa a cicatrização e seu efeito analgésico é benéfico para combater as dores pós-cirúrgicas e a inflamação.

Linha ChemiPet®

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

Administrar por via oral. A dose recomendada é de 1,1 mg de flunixinina por Kg de peso corporal por dia, durante 5 dias consecutivos.

### TABELA DE DOSAGEM

Peso do animal (Kg)	Dose diária	Peso do animal (Kg)	Dose diária
5	1 comprimido	15	3 comprimidos
10	2 comprimidos	20	4 comprimidos

Continuar o tratamento durante pelo menos 2 dias após o desaparecimento dos sintomas.

### PRECAUÇÕES:

- Não administrar em cães com úlcera gástrica ou que não estejam se alimentando.
- Não empregar junto com anestésicos à base de metoxiflurano.
- Pode aparecer vômitos, diarreia ou sangue oculto nas fezes: nestes casos, descontinuar a aplicação do produto e informar o Médico Veterinário.
- Respeitar as indicações de dose e duração do tratamento.
- Evitar a associação com outras drogas anti-inflamatórias ou com substâncias nefrotóxicas.
- Não administrar em gatos.

**Apresentação:** Cartucho contendo 1 blister com 10 unidades de **Flunixin\* Comprimidos 5 mg**.

Conservar à temperatura ambiente (15 °C a 30 °C), ao abrigo da luz solar e fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Venda sob prescrição do Médico Veterinário.

Licenciado no M. A. sob o nº 7.697 em 26/03/01.

Resp. Técnico: Adriana C. P. Cini – CRMV/SP 8413.

**Vencimento:** 2 (dois) anos após a data de fabricação.

**Seu cão deve ser consultado periodicamente pelo Médico Veterinário.**



0029-1013

Proprietário: CHEMITEC AGRO-VETERINÁRIA LTDA.  
Av. Pres. Wilson, 3458 - São Paulo/SP  
Tel.: (11) 2274-7022 - Fax: (11) 2274-9659  
CNPJ (MF): 01.299.649/0001-18 - Ind. Brasileira  
www.chemitec.com.br - \*Marca de Fábrica  
Fabricante: Vansil Ind. Com. Repres. Ltda.  
R. João Augusto Cirelli, 640 - Descalvado/SP  
CNPJ: 50.472.547/0001-68

Linha ChemiPet®